

Ratzia Bag B 25

*Rodenticidní návnada ve formě pasty v sáčkích
na hubení potkanů a myši
- připravena k použití -*



- pro použití profesionálními uživateli a širokou veřejností
- k použití pouze v deratizačních staničkách
- dobrá odolnost proti vlhkosti
- usmrcuje bezbolestně
- velmi silný antikoagulační jed
- fungující i po jednorázové konzumaci

Vlastnosti:

Ratzia Bag B 25 je rodenticidní požerová nástraha ve formě pasty modré barvy dávkované v drobných sáčkích o hmotnosti 20 g. Přípravek je určen pouze k použití v deratizačních staničkách k hubení nežádoucích hlodavců - myši domácí a potkana obecného v interiéru a exteriéru kolem budov, profesionálními uživateli a širokou veřejností.

Mechanismus účinku : Účinná látka Brodifacoum usmrcuje bezbolestně aniž by přitom byli varováni nebo se stali nedůvěřivými jedinci téhož druhu. Brodifacoum je velmi silný antikoagulační jed, fungující i po jednorázové konzumaci.

V závislosti na přijaté dávce dochází k úhynu postiženého jedince v intervalu 3 – 10 dnů. Citlivost jednotlivých druhů není stejná, dávka přípravku potřebná k usmrcení (letální dávka) zasaženého jedince obecně stoupá s jeho hmotností.

Cílové organismy:

k hubení myši domácí a potkana obecného v interiéru a exteriéru kolem budov

Oblast použití:

v interiéru a exteriéru kolem budov

Návod k použití pro profesionální uživatele:

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi. Před položením nástrahy proveďte průzkum zamořené oblasti a posouzení na místě a určete druh hlodavců, místa jejich aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu a rozsah zamoření. Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením

deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy. Přípravek by měl být používán pouze jako součást systému integrované ochrany proti škůdcům, který zahrnuje například hygienická opatření, a pokud je to možné, i fyzikální metody regulace. Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření. Deratizační staničky by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.).

Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím. Deratizační staničky musí být zřetelně označeny tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticidy a že nesmí být přemísťovány ani otevírány. Je-li přípravek používán ve veřejných prostorách, měly by být ošetřené plochy po dobu deratizace označeny a poblíž nástrah musí být umístěno upozornění vysvětlující riziko primární nebo sekundární otravy antikoagulantem společně s uvedením opatření první pomoci v případě otravy. Nástrahu je třeba zajistit tak, aby ji nebylo možné z deratizační staničky odtáhnout. Umístěte přípravek mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat. Neumísťujte přípravek v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu. Během manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v informacích o přípravku). V případě potřeby uveďte jakékoli jiné osobní ochranné pracovní prostředky (například ochranné brýle nebo masku), které jsou při manipulaci s přípravkem nutné. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Pokud je požer nástrahy vzhledem ke zjevnému rozsahu zamoření nízký, zvažte přenesení deratizačních staniček na jiné místo a možnost přechodu na jinou formu nástrahy. Pokud po 35 dnech deratizace dochází i nadále k požírání nástrah a nezaznamenáte žádný pokles aktivity hlodavců, je nutné stanovit pravděpodobnou příčinu. Po vyloučení jiných možností je pravděpodobné, že hlodavci jsou rezistentní, zvažte tedy použití jiného než antikoagulačního rodenticidu, pokud je k dispozici, případně silnějšího antikoagulačního rodenticidu. Zvažte rovněž alternativní regulaci hlodavců pomocí pastí.

Upozornění pro profesionální uživatele vzhledem ke specifickým použitím přípravku:

Myš domácí v interiéru:

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně jednou za 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Potkan obecný v interiéru:

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Myš domácí/potkan obecný v exteriéru kolem budov:

Chraňte nástrahu před povětrnostními podmínkami (např. deštěm, sněhem atd.). Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Deratizační staničky je nutno kontrolovat [u myši – nejméně každé 2 až 3 dny, u krys a potkanů – nejdříve 5 až 7 dnů] po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

Návod k použití pro širokou veřejnost:

Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi. Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pasti). Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy. Deratizační staničky je třeba umístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců (např. stezky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.). Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím. Umístěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat. Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu. Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky.

Upozornění pro širokou veřejnost vzhledem ke specifickému použití přípravku:

Myš domácí v interiéru:

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně jednou za 2 až 3 dny na zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda

jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Potkan obecný v interiéru:

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Potkan obecný v exteriéru kolem budov:

Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy. Vyměňte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

APLIKAČNÍ DÁVKA

Profesionální uživatelé:

- **Myš domácí v interiéru:** 20 g až 40 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů.
- **Potkan obecný v interiéru:** 100 g až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů.
- **Myš domácí/potkan obecný v exteriéru kolem budov:** myš domácí: 20 až 40 g nástrahy na jednu deratizační staničku; potkan obecný: 100 g až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů.

Široká veřejnost

- **Myš domácí v interiéru:** 20 g až 40 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů.
- **Potkan obecný v interiéru:** 100 g až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů.
- **Potkan obecný v exteriéru kolem budov:** 100 g až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li zapotřebí více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 5 metrů.

ÚDAJE O PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍCH BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

Profesionální uživatelé

Pokud je to možné, informujte před zahájením deratizace případné osoby, které se vyskytují v blízkosti (například uživatele deratizované oblasti a jejího okolí) o deratizaci hlodavců v souladu s metodickým pokynem pro provádění ochranné deratizace podle § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Aby se snížilo riziko sekundární otravy, v průběhu deratizace v častých intervalech (např. nejméně dvakrát týdně) vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce. Uhynulá těla hlodavců musí být neškodně odstraněna zahrabáním na určeném místě nebo spálením na základě povolení Státní veterinární správy. Přípravky se nesmí používat déle než 35 dnů bez vyhodnocení stavu zamoření a účinnosti deratizace. Nepoužívejte nástrahy obsahující antikoagulační účinné látky jako stálé nástrahy za účelem prevence zamoření hlodavci nebo sledování aktivity hlodavců.

Další důležitá upozornění:

- přípravek v balení určeném pro profesionální uživatele nesmí být dodáván široké veřejnosti
- přípravek je určen k použití pouze v deratizačních staničkách přiměřeně odolných proti násilnému otevření
- deratizační staničky řádně označte informacemi o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích přípravku, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy
- při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů
- v případě, že na konci deratizace máte podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozorujete aktivitu hlodavců), vyžádejte si radu dodavatele přípravku anebo kontaktujte na deratizační službu
- mezi jednotlivými použitými neomývejte deratizační staničky vodou.

Široká veřejnost

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdále) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření. Nepoužívejte antikoagulační rodenticidy jako stálé nástrahy (např. k prevenci zamoření hlodavci nebo k odhalení aktivity hlodavců).

Další důležitá upozornění:

- přípravek je určen k použití pouze v deratizačních staničkách přiměřeně odolných proti násilnému otevření
- deratizační staničky řádně označte informacemi o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích přípravku, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy
- při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dnů.

- v případě, že na konci deratizace máte podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozorujete aktivitu hlodavců), vyžádejte si radu dodavatele přípravku anebo kontaktujte na deratizační službu
- v průběhu deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhynulé hlodavce, a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujete deratizační staničky.

Účinná látka:

0,025 g/kg Brodifacoum

Balení:

pro profesionální uživatele: od 3 kg do 25 kg,

pro širokou veřejnost: do 50 g k hubení myši domácí, do 150 g k hubení potkana obecného